

KULLANMA TALİMATI

BUTAMCOD FORT PLUS 22,5 mg/ 5 mL şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 mL şurup, 22,5 mg butamirat sitrat (4,5 mg/mL) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum sitrat dihidrat, sodyum benzoat, sorbitol %70 (non-kristalin), propilen glikol, gliserol, sukroz, masking flavour, portakal aroması, sitrik asit monohidrat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BUTAMCOD FORT PLUS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BUTAMCOD FORT PLUS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BUTAMCOD FORT PLUS'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BUTAMCOD FORT PLUS nedir ve ne için kullanılır?

- BUTAMCOD FORT PLUS etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.

- BUTAMCOD FORT PLUS, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dâhildir.
- BUTAMCOD FORT PLUS, 28 mm PE contalı çocuk emniyetli kapaklı 100 cc 28/20 amber renkli Tip III cam şişede 5 mL’lik ölçülü kaşık ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.
- BUTAMCOD FORT PLUS çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikâyetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2. BUTAMCOD FORT PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAMCOD FORT PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya BUTAMCOD FORT PLUS’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa

Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise BUTAMCOD FORT PLUS’ı kullanmayınız.

BUTAMCOD FORT PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. BUTAMCOD FORT PLUS’ın bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük kötüleşirse ya da 7 günden daha uzun süre devam ederse ve/veya ateş ya da inatçı baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BUTAMCOD FORT PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

BUTAMCOD FORT PLUS’ın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

BUTAMCOD FORT PLUS’ı aç ya da tok karnına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

- Hamile iseniz, ilk  ay BUTAMCOD FORT PLUS kullanmamanız nerilmektedir. Daha sonraki dnemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduėuna karar verirse BUTAMCOD FORT PLUS kullanabilirsiniz.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.*

Emzirme

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Bebeėinizi emziriyorsanız, BUTAMCOD FORT PLUS almadan nce doktorunuza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

- BUTAMCOD FORT PLUS uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle ara ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diėer iřleri yaparken dikkatli olunuz.

BUTAMCOD FORT PLUS'ın ieriėinde bulunan bazı maddeler hakkında nemli bilgiler

BUTAMCOD FORT PLUS sorbitol iermektedir. Eėer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduėu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Propilen glikol ieriėinden dolayı alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

BUTAMCOD FORT PLUS, sukroz ierir. Eėer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduėu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Diėer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eėer balgam sktrc zelliėi olan bařka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUTAMCOD FORT PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

12 yaş üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1 ölçülü kaşık (5 mL)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 1 ölçülü kaşık (5 mL)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTAMCOD FORT PLUS'ı 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

BUTAMCOD FORT PLUS ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlanmak için ölçü kaşığı kullanınız. Ölçü kaşığı her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

BUTAMCOD FORT PLUS Şurup 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. BUTAMCOD FORT PLUS Şurup'un, 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

BUTAMCOD FORT PLUS'ın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

BUTAMCOD FORT PLUS böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer BUTAMCOD FORT PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD FORT PLUS kullandıysanız:

BUTAMCOD FORT PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda BUTAMCOD FORT PLUS alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

BUTAMCOD FORT PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BUTAMCOD FORT PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek : 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:

- Uyku hali
- Bulantı, ishal
- Ürtiker (kurdeşen)

Bunlar BUTAMCOD FORT PLUS'ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BUTAMCOD FORT PLUS’ın saklanması

BUTAMCOD FORT PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD FORT PLUS’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz BUTAMCOD FORT PLUS’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23

Bağcılar / İstanbul

Telefon: 0212 410 39 50

Faks: 0212 447 61 65

Üretim yeri: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mah. 11. Sok. No:5

Kapaklı / Tekirdağ

Bu ilacın güncel fiyatını, SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığını, muadil ilaçları ve reçete durumunu görmek için tıklayın.
<https://ilacin.com/ilaclar/butamcod-fort-plus-225-mg-5-ml-surup-100-ml-8699828570332/>

Bu kullanma talimatı --/--/---- tarihinde onaylanmıştır.