

KULLANMA TALİMATI

CAMPRAL 333 mg 84 enterik tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 333 mg Akamprosata içerir.
- **Yardımcı maddeler :** Krospovidon, Mikrokrystalize selüloz, Magnezyum silikat, Sodyum nişasta glikolat, Kolloidal silika, Magnezyum stearat, Akrilik asit etil ester ve metakrilik asidin anyonik kopolimeri (EUDRAGIT L 30 D), Talk, Propilen glikol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız*

Bu kullanma talimatında:

1. **CAMPRAL nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **CAMPRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ?**
3. **CAMPRAL nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkileri nelerdir?**
5. **CAMPRAL’in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. CAMPRAL nedir ve ne için kullanılır?

CAMPRAL 333mg Enterik Tablet , barsaklarda çözünen ve alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

CAMPRAL, alkol bağımlısı hastalarda abstinans (alkolden uzak durma) durumunun sürdürülmesine yardımcı olur .

2. CAMPRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

- Akamprosata allerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
- Böbrek yetmezliğiniz varsa.
- Çocuksanız (18 yaş altı)
- Yaşlı iseniz (65 yaş üzeri)

- Emziriyorsanız

CAMPRAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CAMPRAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yemeklerle birlikte alındığında ilacın emilimi azalabilir, bu nedenle mümkünse aç karnına alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuzun tavsiyesi haricinde, gebelik döneminde CAMPRAL kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Emziren kadınlarda CAMPRAL kullanılmamalıdır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

İlacın araba ve makine kullanımı üzerinde hiç bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Alkol ve CAMPRAL’in birlikte kullanımı, her ikisinin de vücuttaki aktivitesini etkilemez. Disülfiram, akamprosatin yapısını etkilemez ve akamprosatin ve disülfiramın birlikte kullanımı iyi tolere edilir ve alkolsüzlük toleransını yükseltir.

Akamprosatin; alkol bağımlılığı tedavisinde yaygın olarak kullanılan depresyon tedavisi ve anksiyete tedavisi ilaçları ile (diazepam, oksazepam, tetrabamat, meprobamat ve imipramin) etkileşmemektedir.

Disülfiram ile birlikte alınmasının akamprosatin vücuttaki aktivitesi üzerinde etkisi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

60 kg üstündeki kişiler için günde 6 tablet

60 kg altındaki kişiler için ise günde 4 tablet

Uygulama yolu ve metodu:

- Tabletleri bir miktar suyla birlikte yutunuz.
- Tabletleri çiğnemeyiniz.
- Kaç tablet alacağınızı ve bunları hangi sıklıkta alacağınız konusunda her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Bu ilacın güncel fiyatını, SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığını, muadil ilaçları ve reçete durumunu görmek için tıklayın.
<https://ilacin.com/ilaclar/campiral-84-enterik-tablet-8699808040015/>

Dozaj, sabah, öğle ve akşam şeklinde üçe bölünerek veya doktorunuzun önerdiği şekilde alınır.

6 tablet : sabah iki, öğle iki ve akşam iki tablet

4 tablet : sabah iki, öğle bir ve akşam bir tablet

Eğer sindirim sisteminizde engel bir durum yoksa ilacı aç karnına alınız.

Tedavinin süresi:

Ortalama tedavi süresi 1 yıldır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CAMPRAL'in çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş üstündeki hastalarda CAMPRAL kullanılması önerilmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu konuda yeterli veri olmadığından CAMPRAL kullanımı ile ilgili hekiminizin tavsiyesine uyunuz.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa CAMPRAL kullanılması önerilmemektedir.

Eğer CAMPRAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CAMPRAL kullandıysanız:

CAMPRAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CAMPRAL' i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CAMPRAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CAMPRAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CAMPRAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Allerjik reaksiyonlar:

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
- Döküntü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CAMPRAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Çok yaygın yan etkiler:

- İshal

Yaygın yan etkiler:

- Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, gaz şikayeti, kaşıntı, ciltte kızarıklık veya kabarcık, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık

Yaygın olmayan yan etkiler:

- Cinsel istekte artış

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

- Aşırı hassasiyet reaksiyonları

Eğer bu yan etkilerden biri ciddi hal alırsa veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

4. CAMPRAL'ın saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Etiketindeki son kullanma tarihinden sonra Campral'ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

30° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Campral'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumanıza yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi Adı: Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş.

Kayışdağı Caddesi, Kar Plaza No. 45 Kat 7,
34752 İçerenköy / İstanbul

Tel : 0216 578 66 00

Faks : 0216 578 66 99

e-mail : bilgi@merckgroup.com

Üretim yeri : MERCK SANTE S.A.S.

2, rue du Pressoir rue du Pressoir Vert
45400 Semoy / Fransa

Bu Kullanma Talimatının Son Onay (Tarihi):
