

KULLANMA TALİMATI

DAFLON 500 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg; saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonu bulunmaktadır. Bir fraksiyon,

Diosmin.....450 mg
Hesperidin 50 mg

şeklinde ifade edilen flavonoid fraksiyonlarına eşdeğerdir.

Yardımcı maddeler: Jelatin, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, talk. Gliserol, makrogol 6000, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit, sodyum lauril sülfat, titanyum dioksit, sarı demir oksit, Metilhidroksipropil selüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **DAFLON 500 nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DAFLON 500 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DAFLON 500 nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkileri nelerdir?**
5. **DAFLON 500 'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır

1. DAFLON 500 nedir ve ne için kullanılır?

- DAFLON 500 mg film kaplı tablet, 60 tabletten oluşan blister ambalajda bulunmaktadır.
- Daflon 500 Venotonik ve venoprotektör grubuna aittir. Alt ekstremitelerde, venöz tonüs yetmezliği üzerinde etkilidir.

DAFLON 500,

- Kronik venöz yetersizliğinde:
 - ağırlık ve şişkinlik hissi, venöz bacak ödemi
 - ağrı
 - gece gelen kramplar,
- Hemoroid krizlerine ait fonksiyonel belirtilerin tedavisinde kullanılmaktadır.

2. DAFLON 500'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DAFLON 500'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer etkin maddeye veya DAFLON 500'ün içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).

DAFLON 500'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Akut hemoroid krizlerinde:
 - Bu ilacın uygulanması, diğer anal şikayetlerin spesifik tedavisi için uygun değildir.
 - Tedavi kısa süreli olmalıdır. Hemoroid semptomları 15 gün içinde geçmediği takdirde doktorunuza başvurulmalı ve tedavi gözden geçirilmelidir.
- Venöz dolaşım hasarlılarında:
 - Bu ilaç sağlıklı bir yaşam çerçevesinde uygulanmalıdır. Güneşe ve ısıya maruz kalmayınız, uzun süre ayakta durmayınız ve aşırı kilo almamaya özen gösteriniz.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

DAFLON 500'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli çalışma olmadığından hamilelik döneminde kullanımdan kaçınılmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

DAFLON 500 araç veya makina kullanmanızı etkilemez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Daflon 500'ün herhangi bir ilaçla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ve lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DAFLON 500 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz sıklığı için talimatlar

Venöz yetersizliğinde: günde iki tablet, biri öğle diğeri akşam yemeği ile birlikte alınır.

Hemoroid krizlerinde. ilk dört gün, günde 6 tablet; sonraki 3 gün, günde 4 tablet alınır.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler yemek ile birlikte alınır. Tabletler yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulur.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz DAFLON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Belirtiler devam ettiği sürece Daflon 500 mg ile tedavinize devam ediniz.
- *Eğer DAFLON 500'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

Kullanmanız gerekenden daha fazla DAFLON 500 kullandıysanız

DAFLON 500'den almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DAFLON 500'ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

DAFLON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DAFLON 500'ün de içerğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz

- Mide rahatsızlıkları
- Rahatsızlık hissi

Bunlar Daflon 500'un hafif yan etkileridir ve tedavinin kesilmesine neden değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

5. DAFLON 500'un saklanması

Daflon 500'ü çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DAFLON 500'ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.,
Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No. 28 Kat: 22-23-24
34398 Maslak, İstanbul, Tel: 0212 329 14 00, Faks: 0212 290 20 30

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş., Hadımköy, İstanbul

Bu kullanma talimatı 19.06.2009 tarihinde onaylanmıştır.