

KULLANMA TALİMATI

HIRELIX FORTE %0,445 Jel

Haricen uygulanır.

Etkin madde: Her 1 g jel içinde olarak 4,45 mg (400 Ü) sığır kaynaklı heparinoid (kondroitin polisülfat) bulunur.

Yardımcı maddeler: İzopropil alkol, poliakrilik asit, propilen glikol, trietanolamin ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **HIRELIX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **HIRELIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **HIRELIX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **HIRELIX'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. HIRELIX nedir ve ne için kullanılır?

- HIRELIX, pıhtı oluşumunu engelleyen, oluşan pıhtıyı eriten ve yangıyı önleyen bir ajandır.
- HIRELIX, kutuda, ağzı plastik burgulu kapaklı, içi sarı laklı, 40 g jel içeren beyaz, metal tüp ambalajlarda sunulur. Açık amber renkli, saydam veya hafif opalesans jel görünümündedir.
- HIRELIX, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
- Yüzeysel flebit (toplar damarların yangısı),
- Hematomlu (zedelenmiş bir damardan sızan kanın dokularda birikmesi) veya hematom olmayan künt yaralanmalar.
- HIRELIX, sığır kaynaklı mukopolisakkarit polisülfat (kondroitin polisülfat) içerir.

2. HIRELIX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HIRELIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer HIRELIX'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.
- HIRELIX'i açık yaralara veya hasarlanmış deriye uygulamayınız.

HIRELIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

“HIRELIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümlerine bakınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mukopolisakkarit polisülfat hamilelerde haricen kullanıldığı zaman doğmamış bebek üzerine zarar verici etkileri olduğuna dair bildiri yoktur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mukopolisakkarit polisülfat emzirenlerde haricen kullanıldığı zaman bebek üzerine zarar verici etkileri olduğuna dair bildiri yoktur.

Araç ve makine kullanımı

HIRELIX’in araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.

Hirelix ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HIRELIX’in içeriğinde bulunan propilen glikol deride iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HIRELIX ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. HIRELIX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

3-5 cm jel hastalıklı cilt bölgesine parmakla hafifçe yayılarak sürülür ve bu işlem günde 2-3 defa tekrarlanır; gerekli görülürse daha sık kullanılabilir.

HIRELIX ile tedavi şikayetleriniz yatışana kadar sürdürülmelidir. Künt yaralanmalar için olağan tedavi süresi, 10 güne kadardır; yüzeysel flebit içinse 1-2 haftadır. Daha uzun bir müddet boyunca kullanımına yönelik bir engel bulunmamaktadır. Yine de, eğer şikayetleriniz 2 haftalık düzenli HIRELIX tedavisinden sonra düzelmemişse veya tedavi sonlandırıldıktan sonra şikayetleriniz tekrarlırsa lütfen doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Hastalıklı cilt bölgesine parmakla hafifçe yayılarak sürülür.

Alkol içeren tüm jellerde olduğu gibi, HIRELIX FORTE Jel, sargı altına kullanım için uygun değildir. HIRELIX, fonoforez (ultrason tedavisi aracılığıyla haricen uygulanan ajanların ciltten geçmesini sağlayan bir tedavi yöntemi), iontoforez (elektik akımının kullanıldığı bir tedavi yöntemi) için de uygundur.

Göz, açık yaralar, muköz membranlar (ağız içi mukozası, burun mukozası gibi) ve hasarlanmış deri ile temasından kaçınınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

Eğer HIRELIX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HIRELIX kullandıysanız:

Talimata göre kullanıldığında HIRELIX ile doz aşımı bilinmemektedir. Yanlışlıkla ağız yoluyla alınırsa etkin maddenin neden olabileceği doz aşımı belirtileri beklenmez.

İzopropil alkol içeriğinden dolayı özellikle çocuklarda yanlışlıkla yüksek miktarda ağız yoluyla HIRELIX alımından sonra akut alkol zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Bu durumda derhal tedavi önlemleri alınmalıdır.

HIRELIX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HIRELIX'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı uygulayınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

HIRELIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HIRELIX 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ařağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza syleyiniz

Ciltte kızarıklık gibi duyarlılık reaksiyonu olabilir. Bu kızarıklık ilacın kesilmesiyle genellikle hızla iyileřir.

Bunlar HIRELIX 'in hafif yan etkileridir.

Eęer bu kullanma talimatında bahsi geemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz; eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıęınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İla Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Trkiye Farmakovijilans Merkezi (TFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduęunuz ilacın gvenlilięi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı saęlamıř olacaksınız.

5. HIRELIX'in saklanması

HIRELIX'i ocukların gremeyeceęi, eriřemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklıęında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu zerinde yazılı olan kullanma tarihinden sonra HIRELIX'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaçları pe atmayınız! evre, řehircilik ve İklım Deęiřiklięi Bakanlıęınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi : Pharmamek İla A. ř.
Atařehir/İstanbul

retim Yeri :Pharma Plant İla San. ve Tic. A.ř.
Kadıky/İstanbul

Bu kullanma talimatı 20.04.2025 tarihinde onaylanmıřtır.