

KULLANMA TALİMATI

KONAZOL Medikal Şampuan

Saçlı deriye ve/veya deri üzerine bölgesel olarak uygulanarak kullanılır.

- **Etkin madde :**KONAZOL Medikal Şampuan, her gramında 20 miligram ketokonazol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Eritrosin, bütıl hidroksitoluen, EDTA disodyum, sodyum metabisülfıt ,metilparaben sodyum, esans (little john, granny smith) ,hidroklorik asit (%37'lik), PEG-75 lanolin, kokoamid DEA, laureth fatty alkol, poliglikoleter sülfosüksinat, sodyum lauril eter sülfat (%70), PEG-200 hidrojene gliseril palmate + PEG-7 gliseril kokoat, sodyum hidroksit (% 5'lik) ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. KONAZOL nedir ve niçin kullanılır?
 2. KONAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. KONAZOL nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. KONAZOL 'un saklanması
- Başlıkları yer almaktadır.

1. KONAZOL nedir ve ne için kullanılır?

- KONAZOL Medikal Şampuan, saçlı deri ve/veya deri üzerine uygulanacak şampuan formundadır.
- KONAZOL Medikal Şampuan, 100 ml'lık plastik şişeler halinde piyasaya sunulmaktadır.
- KONAZOL'un etkin maddesi olan ketokonazol, imidazol türevi sistemik antimikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Ketokonazol mantar hücresi duvarının yapısını bozarak, mantar hücresinin ölümüne yol açar.

Mantarlar, içinde yaşadığımız çevrede yaygın olarak bulunan mikroorganizmalardır. Vücut yüzeyinde veya iç organlarda yerleşerek çok değişik türlerde mantar enfeksiyonlarına yol açarlar. Oluşan enfeksiyon hastalığının belirtileri, tutulan bölgeye ya da organa göre değişebilmektedir.

- Pityriasis versicolor, seboreik dermatit ve pityriasis capitis, mantarların deri ve /veya saçlı deriye yerleşerek oluşturdukları değişik yüzeysel enfeksiyon türleridir. Tüm bu enfeksiyonlarda kepeklenme veya deride daha iri kabuklanmalar dikkat çekicidir.
- KONAZOL Medikal Şampuan, deride ortaya çıkan, pityriasis versicolor, seboreik dermatit ve pityriasis capitis adlarındaki mantar enfeksiyonlarından korunma ve tedavide kullanılmaktadır.

2. KONAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KONAZOL 'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer ;

- Ketokonazole veya KONAZOL Medikal Şampuan içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz; Emin değilseniz, KONAZOL Medikal Şampuan'ı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

KONAZOL 'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer ;

- Saçınıza betametazon ya da hidrokortizon gibi steroid bir losyon ya da krem kullanıyorsanız,

- KONAZOL Medikal Şampuan tedavisinin ilk 2-3 haftası sırasında losyon ya da kremi daha az kullanmalısınız.
- KONAZOL Medikal Şampuan etkisini göstermeye başladığında bu sizin alevlenen durumunuzu durduracaktır.

Eğer steroid losyonunuz ya da kreminizi bırakmakla ilgili sorunlarınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte KONAZOL Medikal Şampuan'ın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yürütülmemiştir. KONAZOL Medikal Şampuan'ın laktasyonda kullanımıyla ilişkili bilinen bir risk yoktur.

Araç ve makine kullanımı

KONAZOL Medikal Şampuan'ın araç ve makine kullanımını etkilemesi olası değildir.

KONAZOL Medikal Şampuan'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Yardımcı maddeler arasında bulunan bütil hidroksi tolüen, topikal olarak uygulandığında lokal deri reaksiyonlarına (örn., kontakt dermatit) ya da gözlerde ve deri altı tabakasında irritasyona sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün içerdiği metil parabenden dolayı alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KONAZOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

KONAZOL ‘ü her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. KONAZOL Medikal Şampuan bebekler ve çocuklar için tavsiye edilmez. KONAZOL Medikal Şampuan yalnızca saçınız ya da deriniz için kullanılır. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Kepeklenme, kuru, yağlı kabuklu cilt için:

- Haftada iki kez şampuanı kullanmaya başlayın.
- İki haftadan dört haftaya kadar her 3 ya da 4 gün şampuanı kullanmalısınız.
- Sonrasında semptomların geri gelmesini önlemek için şampuanı her 1-2 haftada bir kez kullanmalısınız.
- Şampuanınızı doktorunuzun size söylediğinden daha sık kullanmayınız.

Derideki beyaz- kahverengi lekeler için:

- Şampuanı derinin beyaz- kahverengi lekeleri üzerine günde 1 kez 5 gün kadar kullanmalısınız.
- Eğer güneşe çıktığınızda beyaz- kahverengi lekeler daha belirgin hale geldiyse;derinizin bir sonraki güneşe maruz kalmasından önce 1 kez 3 gün boyunca şampuanı kullanmalısınız.
- Şampuanınızı doktorunuzun size söylediğinden daha sık kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

KONAZOL Medikal Şampuan, deri ve saçlı derinin hastalıklı bölgesine uygulanır.3-5 dakika bekletildikten sonra su ile durulanır. Sadece saçlar değil, deri de iyice yıkanmalıdır.

Eğer tedavi arasında saçınızı yıkamanız gerekirse, normal bir şampuan kullanınız.

Eğer saçınız kalın ya da uzunsa, saçınızı önce her zaman kullandığınız şampuanınızla yıkayınız daha sonra KONAZOL Medikal Şampuan'ı kullanınız.

KONAZOL Medikal Şampuan gözünüze kaçarsa gözlerinizi yumuşak bir biçimde soğuk suyla yıkayınız.

Şampuanı yuttuğunuz takdirde hemen doktorunuzla konuşunuz.

Özel kullanım durumları:

KONAZOL Medikal Şampuan'ın özel kullanım durumu yoktur.

Eğer KONAZOL'ün etkisinin çok güçlü yada çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KONAZOL kullandıysanız.

KONAZOL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KONAZOL kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız an KONAZOL Medikal Şampuan'ı kullanmalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KONAZOL 'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KONAZOL 'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Nefes almada ve yutkunmada zorluğa neden olan yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme şeklinde alerjik reaksiyonlar.
- Şampuanın uygulandığı yerdeki derinin kızarması ya da şiddetli iritasyonu ya da tedavinin ilk günlerinde başka alerji işaretleri.
- Derinin kabarması ya da soyulması.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin KONAZOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

KONAZOL Medikal Şampuan 'ın şimdiye kadar ciddi bir yan etkisi görülmemiştir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişide 1'den az):

- Saç köklerinde enfeksiyon
- Gözyaşı üretiminde artış
- Beklenmedik saç kaybı ya da saç incilmesi
- Derinin kuruması, döküntü, yanma hissi
- Saçlarınızda hissettiğiniz değişiklikler

Seyrek görülen yan etkiler (1000 kişide 1'den az):

- Tat bozukluğu
- Gözlerde tahriş
- Akne
- Deride pullanma

Aşağıda raporlanan yan etkiler belirli bir sıklıkta tanımlanmayabilir ve bu yüzden ne kadar sıklıkla meydana geldikleri bilinmiyor olarak sınıflandırılırlar:

- Kurdeşen (ürtiker olarak da bilinir)
- Saç renginde değişiklikler

Bunlar KONAZOL 'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuza yada eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ İlaç Yan Etki Bildirimi ”ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. KONAZOL ‘ün saklanması

KONAZOL Medikal Şampuan 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KONAZOL Medikal Şampuan' ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve /veya ambalajın bozluklar fark ederseniz KONAZOL Medikal Şampuan'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:KURTSAN İLAÇLARI A.Ş.

Bağcılar 34218 İSTANBUL

Üretim Yeri : RECORDATİ İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Esenyurt /İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.