

KULLANMA TALİMATI

LACİPİL™ 4mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablette; 4 mg lasidipin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, laktoz monohidrat (spreyle kurutulmuş), povidon K30, magnezum stearat, Opadry white YS-1-18043, Opadry white OY-S-7335, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- o Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- o Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **LACİPİL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **LACİPİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **LACİPİL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **LACİPİL'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. LACİPİL nedir ve ne için kullanılır?

LACİPİL, yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Kalsiyum kanal blokörleri denilen bir ilaç grubunun üyesidir. LACİPİL kan damarlarını genişletir, böylece kan akımının daha kolay olmasına yardımcı olur ve kan basıncını düşürür.

2. LACİPİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LACİPİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız ya da emziriyorsanız
- Lasidipin veya LACİPİL'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı(alerjik) iseniz
- Aort stenozu adı verilen bir kalp rahatsızlığınız varsa (Bu durum, kalp kapakçığının daralması sonucu kan akımının engellenmesidir).
- Son bir ayda kalp krizi geçirdiyseniz
- Göğüs ağrısı, hızlı ve zayıf kalp atımı, hızlı soluk alma, düşük kan basıncı, deride soğuma, dudaklarda morarma, sersemlik, baygınlık ya da bulantı hissederseniz ilacı kesiniz.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuz sizi kontrol edene kadar LACİPİL kullanmayınız.

LACİPİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

LACİPİL'i almadan önce doktorunuzun aşağıdakileri bilmesi gerekmektedir.

- Kalp problemlerinizi varsa
- Karaciğer rahatsızlığınız varsa veya olmuşsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

LACİPİL'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

LACİPİL'i alırken greyfurt suyu içmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LACİPİL'in hamile kadınlarda güvenliliğine ilişkin bilgi yoktur. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, doktorunuza danışmadan LACİPİL kullanmayınız. Doktorunuz LACİPİL'in size sağlayacağı yararları ve bebeğe olabilecek riskleri değerlendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LACİPİL'in içeriğindeki maddeler anne sütüne geçebilir. Emzirme döneminde LACİPİL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

LACİPİL kullanırken sersemlik hissederseniz araç ya da makine kullanmayınız.

LACİPİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar LACİPİL'in çalışmasını etkileyebilir veya olası yan etkilerini arttırabilirler.

LACİPİL'de bazı ilaçların çalışmasını etkileyebilir. Bunlar;

- Kalp atımını kontrol eden ilaçlar (antiaritmikler)
- Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar. Örn; furosemid, propranolol veya kaptopril
- Depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresanlar)
- Sakinleştiriciler ya da uyku ilaçları
- Antibiyotikler
- Allerji için kullanılan antihistaminikler
- Simetidin (mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır)
- Siklosporin (organ nakillerinde organ reddini önlemek için veya ciddi bağışıklık sistemi hastalıklarında kullanılır)
- Kortizon içeren ilaçlar ve tetrakosaktid (ACTH) (doğal steroid hormonlarının yapımını arttırmak için kullanılır)

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyin.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LACİPİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışın. Doğru sayıda tableti doğru zamanda almak önemlidir.

LACİPİL'in olağan başlangıç dozu, sabahları günde bir kez 4 mg tablettir. Doktorunuz yaklaşık 3-4 hafta sonra sabahları günde bir kez olmak üzere dozu 6 mg'a çıkarmaya karar verebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Bir miktar su ile birlikte yutulmalıdır.
Her gün aynı saatte almanız en iyisidir.
LACİPİL aç veya tok karna alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: Çocuklarda LACİPİL kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği: LACİPİL'in etkisi artabileceğinden doz ayarlaması gerekebilir.

Eğer LACİPİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LACİPİL kullandıysanız:

Eğer LACİPİL'den gerekenden fazla kullandıysanız, büyük olasılıkla kan basıncınız düşebilir (istenenden fazla) ve kalp atışlarınız değişebilir (daha hızlı veya daha yavaş). Bu durumda doğrudan bir hastaneye gitmeniz gerekebilir.

LACİPİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LACİPİL'i kullanmayı unutursanız

Sabah ilaç almayı unuttuğunuzu aynı gün içerisinde hatırlarsanız alınız. Ertesi gün hatırlarsanız yalnızca o günün dozunu alınız. Unuttuğunuz dozu dengelemek için fazladan bir tablet almayınız. *Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

LACİPİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

LACİPİL'i doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfında kullanın. Doktorunuz size söylemeden ilacı almayı bırakmayın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LACİPİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa LACİPİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek (1.000 kişide 1'den daha fazla);

- Ciddi alerjik reaksiyonlar; yüzde, dilde ve boğazda şişme sonucu nefes almada ve yutkunmada zorluk oluşabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilere sahiptir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise, sizin LACİPİL'e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (10 kişide 1'den daha fazla);

- Kalp atışlarında düzensizlik
- Kalp atışının hızlanması

Yaygın olmayan (100 kişide 1'den fazla);

- Gittikçe kötüleşen göğüs ağrısı
- Baygınlık
- Kan basıncının düşmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilere sahiptir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10 kişide 1'den daha fazla);

- Sıvı kaynaklı şişkinlik
- Baş dönmesi
- Normalden fazla idrar çıkışı
- Baş ağrısı
- Deri döküntüsü (kızamıksı ve kaşıntılı)
- Kızarıklık
- Karında rahatsızlık hissi
- Bulantı
- Güçsüz hissetme
- Karaciğer test sonuçlarında değişiklik

Yaygın olmayan (100 kişide 1'den fazla);

- Dişetinde hassasiyet, kanama

Seyrek (1.000 kişide 1'den daha fazla);

- Deride kaşıntılı kabartılar, kurdeşen (ürtiker)
- Depresyon
- Kas krampları

Çok seyrek (10.000 kişide 1'den daha fazla);

- Kollarda ve bacaklarda titreme, sallantı

Bunlar LACİPİL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. LACİPİL'in Saklanması

LACİPİL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayınız.

Orijinal paketinde ve ışıktan koruyarak saklayınız.

LACİPİL almaya hazır olana kadar tableti folyodan çıkarmayın.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LACİPİL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

Üretici:

Glaxo Wellcome SA, İspanya

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.