

## KULLANMA TALİMATI

### MULTİMİX pediatrik şurup Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir ölçek (5 mL) 2500 IU A vitamini, 0.9 mg B<sub>1</sub> vitamini, 1 mg B<sub>2</sub> vitamini, 1.3 mg B<sub>6</sub> vitamini, 45 mg C vitamini, 400 IU D<sub>3</sub> vitamini, 8.94 mg E vitamini, 3.5 mg D-Pantenol, 0.085 mg D-Biotin, 11 mg Nikotinamid içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Ksilitol, gliserin, propilen glikol, kremofor RH 40, DL-lakton, sodyum benzoat (E211), sodyum hidroksit, etanol, portakal esansı, demineralize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **MULTİMİX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MULTİMİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MULTİMİX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MULTİMİX'in saklanması**

**başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. MULTİMİX nedir ve ne için kullanılır?**

MULTİMİX,

- MULTİMİX, dengeli oranlarda bir araya getirilmiş bir vitamindir. İçeriğindeki vitamin miktarları 2-12 yaş arasındaki çocukların günlük gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanmıştır.
- 100 mililitrelik şişelerde bulunur.
- İçeriğindeki vitaminlerin eksikliğinin görüldüğü veya gereksiniminin arttığı durumlarda eksikliğin giderilmesinde kullanılır. Şu durumlarda takviye gerekebilir:
  - Ani kilo kaybı, dengesiz ve yetersiz beslenme, günlük vitamin ihtiyacını

- karşılamayan beslenme (ör. süt alımının olmadığı vejeteryan diyetler)
- Yanıklar, ateş, kronik ateş, kronik hemodiyaliz (kanın temizlenmesi işlemi), karaciğer-safra kanalı hastalıkları, hipertiroidizm (tiroid bezinin fazla çalışması, belirtileri; metabolizmada hızlanma, kilo kaybı, terleme, güçsüzlük), uzamış hastalıklar/enfeksiyonlar, barsak hastalıkları, pankreas yetmezliğine bağlı olarak besinlerin yetersiz emilimi, protein eksikliği, yağ emiliminin bozulduğu durumlar.
- Ağız-boğaz hasarları/bozuklukları, sarılık

## 2. MULTİMİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### MULTİMİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzun;

- İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine alerjisi varsa,
- Hipervitaminoz A ve D (vücuttaki vitamin fazlalığı) varsa,
- Hiperkalsemisi (kanda kalsiyum derişiminin normalden fazla olması) varsa,
- Retinoid tedavisi görüyorsa (epitel hücrelerin çoğalmasını engelleyen A vitamini sentetik türevi bir ilaç ile yapılan tedavi)

### MULTİMİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer çocuğunuz aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsa,

- D vitamini içeren ilaçlar
- A vitamini içeren ilaçlar
- Anestezi için kullanılan barbitüratlar
- Nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### MULTİMİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ölçğinde 100 mg'dan daha az etanol (alkol) içerir.

### Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MULTİMİX'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

- Antikonvülsanlar
- Anestezi için kullanılan barbitüratlar
- Nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar
- Ganglionik blokörler (Sinir hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bölgelerde sinir iletimine engel olarak kan basıncını düşüren ilaçlar)

*Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. MULTİMİX nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:  
6 yaşından küçük çocuklara günde yarım ölçek,  
6 yaşından büyük çocuklarda günde 1 ölçek veriniz.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

MULTİMİX sadece ağızdan kullanım içindir.

MULTİMİX'i 6 yaşından küçük çocuklara su, meyve suyu veya mamaya karıştırarak, 6 yaşından büyük çocuklara kahvaltı ile birlikte verebilirsiniz.

Doktorunuz MULTİMİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

*Eğer MULTİMİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla MULTİMİX kullandıysanız**

*Çocuğunuz MULTİMİX'ten kullanması gerekenden fazlasını kullanmışsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **MULTİMİX'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çocuğunuza çift doz MULTİMİX vermeyiniz.*

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, MULTİMİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

### **Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

A ve D vitamini fazlalığı (A vitamininin fazla alınmasına bağlı olarak kafa içi basıncı artar, kusma ve iştahsızlık gelişir. Yüksek dozda alınan D vitamini sonucu kemiklerden belirgin derecede kalsiyum çözülümüne bağlı olarak kandaki kalsiyum miktarı aşırı yükselir. Bu durumun uzun sürmesi özellikle bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerilemeye neden olur.)

Bunlar MULTİMİX'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız*

*doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. MULTİMİX'in Saklanması**

*MULTİMİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MULTİMİX'i kullanmayınız.*

Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

**Ruhsat Sahibi:** KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40  
Gölbaşı 06830 Ankara  
Tel : 0 312 485 37 60  
Faks : 0 312 485 37 61  
e-posta: keymen@keymen.com.tr

**Üretim yeri:** Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Esenyurt/İstanbul

*Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.*