

KULLANMA TALİMATI

MYCOSPOR® Krem

Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** 100 g kremde 1 g bifonazol bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Benzil alkol, setil palmitat, ketostearil alkol, oktildodekanol, polisorbata 60, sorbitan monostearat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **MYCOSPOR® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MYCOSPOR® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MYCOSPOR® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MYCOSPOR®'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MYCOSPOR® nedir ve ne için kullanılır?

- MYCOSPOR®'un içeriğindeki etkin madde bifonazoldür. Bifonazol etkin maddesi, imidazol türevi adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu gruptaki ilaçlar mantar tedavisinde kullanılır.
- MYCOSPOR®, 10 gramlık tüpler içinde kullanıma sunulmuştur. 1 gram krem 0,01 gram bifonazol (etkin madde) içerir.
- MYCOSPOR®, dermatofitler, mayalar, küfler ve *Malassezia furfur* gibi mantarların neden olduğu derideki mantar enfeksiyonlarının ve *Corynebacterium minutissimum* adlı bakterinin neden olduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
MYCOSPOR®, örneğin el ve ayaklarda oluşan mantar enfeksiyonları (atlet ayağı, tinea manus), deri ve deri kıvrımlarındaki mantar enfeksiyonları (tinea corporis, tinea inguinalis), pityriasis versicolor (*Malassezia furfur* adlı bir mantarın neden olduğu bir mantar hastalığı); yüzeysel kandidiyazis (*Candida* türünden bir mantarın neden olduğu enfeksiyon), erythrasma (*Corynebacterium minutissimum* isimli mikroorganizmanın neden olduğu bir cilt hastalığı) tedavisinde kullanılır.

2. MYCOSPOR® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MYCOSPOR®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

- İlacın içindeki maddelere karşı alerjiniz varsa

MYCOSPOR®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Diğer mantar ilaçlarına karşı alerji öykünüz varsa,

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MYCOSPOR®, hamileliğin ilk 3 ayında ancak doktorunuz tarafından risk/yarar oranı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MYCOSPOR®, emziren kadınlarda ancak hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MYCOSPOR®'un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi gözlenmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

MYCOSPOR®'un bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MYCOSPOR® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 defa, tercihen yatmadan önce kullanılır.

• **Uygulama yolu ve metodu:**

Kremi ince bir tabaka şeklinde hastalıklı cilt bölgesine uygulayın ve masaj yaparak cildinize yediriniz. Genellikle az bir miktar krem el ayası kadar bir bölgenin tedavisi için yeterlidir.

• **Tedavi süresi:**

MYCOSPOR® kullanımı hastalığın bulguları ve belirtileri kaybolduktan sonra kesilmemeli ve aşağıdaki süreler boyunca devam edilmelidir.

Ayak mantarı:	3 hafta
Gövde, el ve deri kıvrımlarında mantar:	2-3 hafta
Pityriasis versicolor ve deriyi etkileyen bir enfeksiyon olan eritrazma:	2 hafta
Derinin yüzeysel mantar hastalığı (yüzeyel kandidiyazis):	2-4 hafta

Doktorunuz MYCOSPOR® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı: MYCOSPOR®'un çocuklarda kullanımı ile ilgili detaylı çalışmalar mevcut değildir. MYCOSPOR® bebeklerde sadece tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: MYCOSPOR®'un yaşlı hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

• **Özel kullanım durumları :**

Özel kullanımı yoktur.

Eğer MYCOSPOR®'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MYCOSPOR® kullandıysanız:

Mycospor'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

MYCOSPOR®'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MYCOSPOR®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MYCOSPOR®'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kremin temas ettiği bölgelerde alerjik reaksiyonlar
- Kremin temas ettiği bölgelerde oluşan deri hastalığı (topikal kullanımdan 2 gün sonra)
- Kızarıklık
- Deride döküntü
- Kurdeşen
- Egzema
- Kaşıntı
- Rahatsızlık hissi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MYCOSPOR®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

MYCOSPOR®'un böyle bir yan etkisi yoktur.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Uygulama yerinde ağrı
- Uygulama yerinde ödem
- Deride su toplama
- Ciltte soyulma
- Deride kuruma
- Deride çürüme
- Ciltte yanma hissi

Bunlar MYCOSPOR®'un hafif yan etkileridir.

MYCOSPOR®'un yan etkileri tedavinin kesilmesiyle kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. MYCOSPOR®'un saklanması

MYCOSPOR®'u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Bu ilacın güncel fiyatını, SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığını, muadil ilaçları ve reçete durumunu görmek için tıklayın.
<https://ilacin.com/ilaclar/mycospor-1-10-gr-krem-8699546351411/>

Ambalajdaki/kartondaki/şışedeki son kullanma tarihinden sonra MYCOSPOR®'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye – İSTANBUL
Tel: 0 216 528 36 00
Fax: 0 216 528 36 12

Üretici: Bayer İlaç Fabrikaları. A.Ş., İstanbul

Bu kullanma talimatı 30/01/2012 tarihinde onaylanmıştır.