

KULLANMA TALİMATI

NETİZON 5 mg+15 mg/5 ml göz damlası, çözelti

Göze uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** Her bir mL 1 mg deksametazona eşdeğer 1.32 mg deksametazon disodyum fosfat ve 3 mg netilmisine eşdeğer 4,55 mg netilmisin sülfat içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Sodyum sitrat anhidrus, monosodyum fosfat monohidrat, disodyum fosfat dodekahidrat, benzalkonyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **NETİZON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NETİZON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NETİZON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NETİZON'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. NETİZON nedir ve ne için kullanılır?

- NETİZON 5 ml çözelti içeren 5 ml'lik düşük yoğunluklu polietilen şişe ambalajında karton kutuda kullanıma hazır steril göz damlasıdır.
- NETİZON, gözün ön bölümünün bakterilere bağlı enfeksiyonlarında ve ameliyat sonrasında gözün ön bölümünün iltihaplı hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. NETİZON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NETİZON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- İçerdiği etkin maddelere, aminoglikozid grubu antibiyotiklere veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
- Göz içi basıncınız yüksek ise (glokom),
- Gözünüzün ön bölümünde (kornea), herpes simplex isimli virüse bağlı enfeksiyonunuz varsa,
- Gözünüzün ön bölümünde (kornea ve konjunktiva) virüse bağlı hastalıklar varsa,
- Gözünüzde mantarlara bağlı enfeksiyon varsa,
- Gözünüzün ön bölümünde yaralanma veya derin, açık yaralarınız varsa,
- Canlı aşı ile aşılanmış iseniz NETİZON'u kullanmayınız.

NETİZON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Göz içi basıncının arttığı durumlar (glokom) varsa 15 günden fazla kullanımlarda göz içi basıncı düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. Eğimli hastalarda uzun süreli kortikosteroid kullanımı göz içi basıncını artırabilir, görme bozukluklarına yol açabilir.
- Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçlar kullanılmamalıdır. Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı:
 - 1) Katarakt oluşmasına
 - 2) Yara iyileşmesinde gecikme
 - 3) Mantar veya virüse bağlı enfeksiyon riskinde artışa yol açabilir. Gözün iltihaplı enfeksiyonlarında kortikosteroidler enfeksiyonu maskeleyebilirler.
- Bazı göz hastalıklarında uzamış kortikosteroid kullanımı gözün ön kısmında (kornea ve sklera) incelmeye yol açabilir.
- Kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmadığı ya da tahriş veya hassasiyet oluştuğunda NETİZON'un kullanılmasına son verilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NETİZON'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

Uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik srecinde NETİZON, ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NETİZON emzirme dneminde kullanılmamalıdır.

Ara ve makine kullanımı

NETİZON'un ara veya makine kullanımı yeteneėi zerinde alıřma yapılmamıřtır.

NETİZON'un ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

NETİZON 0.25 mg benzalkonyum klorr ierir. Benzalkonyum klorr yumuřak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. NETİZON ve yumuřak kontakt lensin eř zamanlı olarak kullanımının gerekli olduėu durumlarda, uygulamadan nce kontakt lensi ıkartınız ve lensi takmak iin en azından 15 dakika bekleyiniz.

NETİZON ieriėinde bulunan yardımcı maddelere karřı ařırı bir duyarlılıėınız yoksa, bu yardımcı maddelere baėlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diėer ilaçlar ile birlikte kullanımı

NETİZON'un diėer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eėer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NETİZON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıėı iin talimatlar:

NETİZON'u alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Tedavi sresi hekim tarafından belirlenmelidir. Tedaviye alınan yanıtı baėlı olarak NETİZON uygulaması doktorun önerisiyle 7±1 gn veya 14±2 gndr. Doktorunuz başka trl tavsiye etmedikçe, hastalıklı gznze gnde 4 defa 1'er damla alt gzkapaėı iine damlatınız.

Doktorunuz başka trl tavsiye etmedikçe, hastalıklı gznze gnde 4 defa 1'er damla alt gz kapaėı iine damlatınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- Tedavi sreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.
- Plastik řiřeyi delmek iin kapaėı sivri uca doėru eviriniz. Sivri ucu evirerek řiřeyi kapatınız.
- İlacı kullanırken ambalajın ucu ile gze ya da başka bir yzeye temastan kaınınız.
- Kullanmadan nce ambalajın zedelenmemiř olduėundan emin olunuz.
- řiře aıldıktan sonra 28 gn iinde kullanılmalıdır.

Deėişik yař grupları:

ocuklarda kullanımı:

NETİZON'un ocuklarda gvenlilik ve etkinliėi alıřılmamıřtır. Bu nedenle ocuklarda, ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

ocuklarda bbrek st bezlerinde baskılanma riski nedeniyle tedavi mmkn olan en kısa sre ile sınırlandırılmalıdır (tercihen 5 gnden az).

Yařlılarda kullanımı:

Yařlılarda zel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

zel kullanım durumları:

Bbrek/Karaciėer yetmezliėi:

Bbrek/Karaciėer yetmezliėi olan hastalarda doktor tarafından nerilen doz dıřında zel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıka, bu talimatları takip ediniz.

Eėer NETİZON'un etkisinin ok gl veya zayıf olduėuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NETİZON kullandıysanız:

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

NETİZON içeriğinin (5 mg deksametazon) tümünün ağızdan alınması halinde istenmeyen etki oluşabilir. Böyle bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.

NETİZON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NETİZON'u kullanmayı unutursanız

Eğer NETİZON'un bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NETİZON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece NETİZON kullanmaya devam ediniz.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, NETİZON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NETİZON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzeyel olarak göze uyguladığınız kortikosteroidleri 15-20 günü aşan sürede kullandığınızda:

- Göz içi basıncının yükselmesi
- Göz merceğinin saydamlığını kaybederek bulanıklaşması (katarakt)
- Gözde şişlik, kızarıklık, ağrı gibi belirtiler gösteren ve aralarında *herpes simplex* adı verilen virüsünde bulunduğu virüs ya da mantar cinsi mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonlar
- İyileşmede gecikme
- Göz küresinde yırtılma olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NETİZON'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Gözde kızarıklık
- Bulanık görme

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Gözde yanma
- Gözde batma

Bunlar NETİZON'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. NETİZON'un saklanması

NETİZON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NETİZON'u kullanmayınız.

Eğer rnde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NETİZON'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaçları pe atmayınız! evre ve řehircilik Bakanlıđınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

VEM İla San. ve Tic. A.ř
Sğtz Mahallesi 2177. Cadde
No: 10B/49 ankaya/ANKARA

retim yeri:

VEM İla San. ve Tic. A.ř.
erkezky Organize Sanayi Blgesi
Karaađaç Mah. Fatih Blv. No:38
Kapaklı / TEKİRDAđ

Bu kullanma talimatı 01/10/2019 tarihinde onaylanmıřtır.