

KULLANMA TALİMATI

THİOCİLLİNE göz pomadı Göze uygulanır.

Etkin maddeler: 5 g pomad, Basitrasin 2500 U.I. ve Neomisin Sülfat 25 mg (Neomisin baz: 17,5 mg içerir.

Yardımcı maddeler: Vazelin likid, beyaz vazelin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **THİOCİLLİNE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **THİOCİLLİNE' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **THİOCİLLİNE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **THİOCİLLİNE' in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. THİOCİLLİNE nedir ve ne için kullanılır?

THİOCİLLİNE, tüp içerisinde 5 gram **beyaz renkli** pomad olarak kullanıma sunulmuş olan ve gözdeki çeşitli iltihabi ve mikrobik durumları ve yaralanmaları kontrol etmek için kullanılan bir göz pomadıdır. THİOCİLLİNE' in içindeki etkin maddeler olan Basitrasin ve Neomisin birçok bakteriye karşı etkili birer antibiyotiktir. THİOCİLLİNE, gözün ön tarafı ve göz kapağındaki bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde ve göz kapağı yara ve yanıklarında kullanılır.

2. THİOCİLLİNE 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

- **THİOCİLLİNE' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- İlacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, kullanmayınız.

- **THİOCİLLİNE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Dirençli mikropların gelişmesine neden olabileceğinden, uzun süreli kullanımından kaçınınız.
- Tedavi sırasında kontakt lensinizi takmayınız.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

THİOCİLLİNE’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

THİOCİLLİNE’ in herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz.

THİOCİLLİNE, hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THİOCİLLİNE emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

THİOCİLLİNE, bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini bekleyiniz.

THİOCİLLİNE,’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Uyarısı olan bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Topikal kullanım ile ilgili herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. THİOCİLLİNE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3-4 defa göze uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Alt göz kapağı aşağıya çekilerek iç tarafına bir miktar sıkılır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlara uyunuz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı : Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır..

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer THİOCİLLİNE' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THİOCİLLİNE kullandıysanız:

THİOCİLLİNE' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

THİOCİLLİNE' i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız

THİOCİLLİNE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi THİOCİLLİNE' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, THİOCİLLİNE' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin THİOCİLLİNE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

Uzun süreli kullanımlarda kızarma, kaşıntı, şişme gibi yan etkiler görülebilir.

Bilinmiyor:

Görme bulanıklığı, İlacın kesilmesiyle bu bulgular kaybolur.

‘Bunlar THİOCİLLİNE’ in nadir etkileridir.’

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. THİOCİLLİNE' in Saklanması

THİOCİLLİNE' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C' nin altında oda sıcaklığında ve serin bir yerde saklayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız THİOCİLLİNE' i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THİOCİLLİNE' i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

İbrahim Hayri Barut Veresesi
Reşitpaşa mahallesi,
Eski Büyükdere Cad. No:4
PK.34467 - Maslak /Sarıyer/ İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 2020

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3
Esenyurt / İstanbul
Tel: (0212) 622 66 00
Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.