

KULLANMA TALİMATI

VENORUTON FORTE 500 mg tablet

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 500 mg O-(Beta-hidroksietil)-rutosid (okserutin) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Makrogol, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **VENORUTON FORTE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VENORUTON FORTE 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VENORUTON FORTE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VENORUTON FORTE 'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. VENORUTON FORTE nedir ve ne için kullanılır?

- VENORUTON FORTE, tablet formunda bir ilaçtır ve her bir tablet etkin madde olarak 500 mg okserutin içerir.
- VENORUTON FORTE, “vazoprotektifler” denilen, damarları koruyucu ilaçların bulunduğu bir ilaç grubuna dahildir.
- VENORUTON FORTE tabletler, yeşilimsi-sarı renkli yuvarlak görünümündedir.
- VENORUTON FORTE, 30 ve 60 tablet içeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.
- VENORUTON FORTE, damarlardaki sürekli yetmezlikten (kronik venöz yetmezlik) kaynaklanan ödem ve belirtilerin (ağrılı, yorgun, şiş, ağır bacaklar, kramplar, uyuşma gibi) hafifletilmesinde kullanılır.
- VENORUTON FORTE ayrıca, damar geçirgenliğinin azalmasına bağlı sorunlarda, hemoroid belirtilerinin rahatlatılmasında, gözün bir tabakası olan retinanın damar geçirgenliğinin değişmesine bağlı problemlerde kullanılır.

2. VENORUTON FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VENORUTON FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Okserutine, diğer rutozitlere veya VENORUTON FORTE’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VENORUTON FORTE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

VENORUTON FORTE’u yemeklerle birlikte alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Hamileliğinizin ilk 3 ayı süresince VENORUTON FORTE kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bebeğinizi emziriyorsanız, VENORUTON FORTE almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

VENORUTON FORTE tedavisinin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

VENORUTON FORTE'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VENORUTON FORTE'un içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VENORUTON FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktora danışmadan kullanmayınız.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

Kronik venöz yetmezlik ve hemoroidal hastalıklarda:

Günde 2 defa 1 VENORUTON FORTE tablet alınız.

Belirtiler genellikle 2 hafta içerisinde düzelir. Bu doza belirtiler ve şişme (ödem) tamamen kayboluncaya kadar devam etmeniz önerilir. Daha sonra tedaviye devam edip etmeyeceğinize ya da hangi dozda devam edeceğinize doktorunuz karar verecektir.

Diabetik retinopati

Günlük önerilen doz aralığı 1800 mg–3000 mg (3–6 VENORUTON FORTE tablet)'dir.

Uygulama yolu ve metodu:

VENORUTON FORTE'u yemeklerle birlikte, yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

VENORUTON FORTE'un çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir kullanım durumu yoktur.

Kalp, böbrek ve karaciğer hastalıklarına bağlı alt kol ve bacaklarında şişme olan hastalarda etkinliği kanıtlanmadığından bu amaçla VENORUTON FORTE kullanımı önerilmez.

Eğer VENORUTON FORTE'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VENORUTON FORTE kullandıysanız:

VENORUTON FORTE'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VENORUTON FORTE'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VENORUTON FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VENORUTON FORTE'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastada 1'den az, fakat 100 hastada 1'den fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastada 1'den az, fakat 1000 hastada 1'den fazla görülebilir.
Seyrek	: 1000 hastada 1'den az görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastada 1'den az görülebilir.
Bilinmeyen	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa VENORUTON FORTE’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Anafloitoit reaksiyonlar (Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt)
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi), yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştıracak şişlik)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VENORUTON FORTE’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek:

- Sersemlik
- Baş ağrısı
- Al basması (Flushing)
- Yorgunluk

Seyrek:

- Mide-bağırsak bozuklukları
- Gaz (şişkinlik)
- İshal
- Karın ağrısı
- Mide rahatsızlıkları
- Hazımsızlık
- Döküntü
- Kaşıntı
- ürtiker

Bunlar VENORUTON FORTE’un’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VENORUTON FORTE’un saklanması

VENORUTON FORTE’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Rutubetten koruyunuz. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENORUTON FORTE’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VENORUTON FORTE’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Üretim Yeri : Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.