

KULLANMA TALİMATI

VİCTOZA® 6 mg/ml kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde enjeksiyonluk çözelti

Deri altına uygulanır.

- **Etkin madde:** Liraglutid 6 mg/ml.
Bir ml enjeksiyonluk çözelti 6 mg liraglutid içermektedir. 3 ml'lik kullanıma hazır dolu kalem 18 mg liraglutid içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Disodyum fosfat dihidrat, propilen glikol, fenol, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **VİCTOZA® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VİCTOZA®'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VİCTOZA® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VİCTOZA®'nın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. VİCTOZA® nedir ve ne için kullanılır?

VİCTOZA®, kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde, berrak, renksiz veya renksiz yakın görünümde bir enjeksiyonluk çözeltidir. Her bir kalem, 30 doz 0.6 mg, 15 doz 1.2 mg veya 10 doz 1.8 mg enjekte edebilen, 3 ml çözelti içermektedir.

VİCTOZA®, *liraglutid* etkin maddesini içermektedir. Sadece kan şekerinizi çok yüksek olduğunda, vücudunuzun kan şekeri düzeyini düşürmesine yardımcı olur. Ayrıca midenizden besin geçişini de yavaşlatır.

VİCTOZA®, diyabette kullanılan diğer ilaçlar kan şekeri düzeylerinizi yeteri kadar kontrol edemediği durumlarda, bu ilaçlar ile birlikte kullanılır. VİCTOZA®'nın birlikte kullanıldığı bu ilaçlar şunlardır:

- oral antidiyabetikler (metformin, pioglitazon, sülfonilüre grubu ilaçlar gibi diyabet tedavisinde ağız yoluyla kullanılan ilaçlar) ve/veya bazal insülin (tüm gün çalışan bir tip insülin).

2. VİCTOZA®'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VİCTOZA®'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Liraglutide ya da VİCTOZA®'nın bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı alerjiniz varsa (bkz. *Yardımcı maddeler*).

VİCTOZA®'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda VİCTOZA® kullanmadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşunuz:

- Eğer önceden geçirilmiş ya da mevcut pankreas hastalığınız varsa.

Eğer tip 1 diyabetiniz (vücudun insülin üretmediği diyabet türü) veya diyabetik ketoasidozunuz (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi) varsa VİCTOZA® kullanılmamalıdır. VİCTOZA® insülin değildir ve bu nedenle insülin yerine kullanılmamalıdır.

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ya da diyalize giriyorsanız VİCTOZA® kullanımı önerilmemektedir.

Karaciğer rahatsızlığı olan hastaların bu ilacı kullanımı ile ilgili az deneyim bulunmaktadır. Karaciğer hastalığınız varsa, bu ilacın kullanımı önerilmemektedir.

Kalp yetmezliği olan hastaların bu ilacı kullanımı ile ilgili az deneyim bulunmaktadır. Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa, bu ilacın kullanımı önerilmemektedir.

Mide boşalmasının gecikmesine (gastroparezis olarak adlandırılır) yol açan ciddi mide veya gut hastalığınız veya inflamatuvar bağırsak hastalığınız varsa, bu ilacın kullanımı önerilmemektedir.

Eğer sürekli, ciddi karın ağrısı gibi akut pankreatit (pankreas iltihabı) semptomları yaşıyorsanız, acilen doktorunuza danışmalısınız (bkz. bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir?).

Tiroid nodülleri ve tiroid bezinin büyümesini içeren tiroid hastalığınız varsa, doktorunuza danışınız.

VİCTOZA® ile tedaviye başlarken, bazı durumlarda sıvı kaybı/dehidratasyon yaşayabilirsiniz, ör. kusma, bulantı ve diyare (ishal) durumunda. Bol miktarda sıvı içerek dehidratasyonu önlemek önemlidir. Eğer herhangi bir sorunuz ya da endişeniz olursa lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VİCTOZA®'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

VİCTOZA® öğünlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VİCTOZA® hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. VİCTOZA®'nın doğmamış bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer hamile iseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VİCTOZA®'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız, VİCTOZA® kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglisemi) odaklanma yeteneğinizi azaltabilir. Eğer hipoglisemi belirtileri yaşarsanız araç ya da makine kullanımından uzak durunuz. Kan şekeri düzeyinde azalma belirtileri için lütfen bölüm 4'e bakınız. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza danışınız.

VİCTOZA®'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.

Bu tıbbi ürün 14.0 mg/ml propilen glikol ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

- Sülfonilüre grubu bir ilaç (glimepirid veya glibenklamid gibi). VİCTOZA®, bir sülfonilüre ile birlikte kullanılırken, sülfonilüreler hipoglisemi riskini artırabileceğinden hipoglisemi (kan şekeri düzeyinde azalma) yaşayabilirsiniz. Bu ilaçları birlikte kullanmaya ilk başladığınızda, doktorunuz sülfonilüre ilacınızın dozunu düşürmenizi isteyebilir. Lütfen, kan şekeri düşmesi belirtileri için "bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir?"e bakınız. VİCTOZA® ile birlikte sülfonilüre grubu bir ilaç (glimepirid veya glibenklamid gibi) kullanıyorsanız, doktorunuz kan şekeri düzeylerinizi ölçmenizi isteyebilir. Bu ölçümler, doktorunuzun sülfonilüre dozunun değiştirilmesine gerek olup olmadığına karar vermesine yardımcı olacaktır.
- Varfarin veya diğer oral antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar. Kanınızın pıhtılaşma yeteneğini belirlemek amacıyla daha sık kan testi yaptırmanız gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VİCTOZA® nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun tarif ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz, diyabet hemşireniz veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Başlangıç dozu, en az bir hafta sürecektir şekilde, günde bir defa 0.6 mg'dır.
- Doktorunuz günde bir defa 1.2 mg'a yükseltmeniz gerektiğinde size bildirecektir.
- Eğer kan glukozunuz 1.2 mg'lık doz ile yeterince kontrol edilemiyorsa, doktorunuz dozu günde bir defa 1.8 mg'a yükseltmeniz gerektiğini bildirebilir.

Doktorunuz bildirmediğiçe, dozunuzu değiştirmeyiniz.

VİCTOZA® deri altına (subkütan) enjeksiyon şeklinde uygulanır. Damar içine ya da kas içine enjekte edilmemelidir. Kendinize enjeksiyonu yapabileceğiniz en uygun bölgeler, bacaklarınızın üst ön tarafı (uyluğunuz), karnınız veya kolunuzun üst kısmıdır.

Yemeklerden bağımsız olarak, günün herhangi bir saatinde enjeksiyonu kendi kendinize yapabilirsiniz. Enjeksiyon için günün en uygun vaktini seçtiğinizde, VİCTOZA®'yı her gün yaklaşık olarak aynı zamanda enjekte etmeniz tavsiye edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

İlk kullanımdan önce, doktorunuz ya da diyabet hemşireniz kalemi nasıl kullanacağınıza gösterecektir.

VİCTOZA® kullanıma hazır dolu enjeksiyon kaleminin kullanımı için detaylı bilgi, bu Kullanma Talimatı'nın sonunda verilen "VİCTOZA® Kalem'in Kullanımı" bölümünde verilmektedir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde güvenlik ve etkinlik verilerinin eksikliğinden dolayı VİCTOZA®'nın bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşın üzerindeki hastalarda, yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekmemektedir. 75 yaş ve üstündeki hastalarda tedavi deneyimi sınırlıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa veya diyaliz tedavisi görüyorsanız VİCTOZA® kullanımı önerilmemektedir.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer sorunları olan hastalarda bu ilacın kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmanız önerilmemektedir.

Eğer VİCTOZA®'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VİCTOZA® kullandıysanız:

VİCTOZA®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Tıbbi tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bulantı, kusma veya diyare yaşayabilirsiniz.

VİCTOZA®'yı kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırlayınca hemen VİCTOZA® kullanınız. Ancak, VİCTOZA®'yı kullanmanız gereken saatten itibaren 12 saatten daha fazla bir süre geçmişse, lütfen unutulmuş dozu almayınız. Ve olağan dozunuzu bir sonraki günde alınız. *Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız veya takip eden günde dozunuzu yükseltmeyiniz.*

VİCTOZA® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan VİCTOZA® kullanımını durdurmayınız. Eğer tedaviyi durdurursanız, kan şekeri düzeyleriniz yükselebilir.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Ciddi yan etkiler

Yaygın:

- Hipoglisemi (kan şekeri düzeyinde azalma). Kan şekeri düşmesi belirtileri aniden ortaya çıkar. Bu belirtiler: soğuk terleme, soğuk soluk deri, baş ağrısı, kalbin hızlı çarpması, kendini hasta hissetme, kendini çok aç hissetme, görmede değişiklikler, uyku hissi, zayıf, sinirli, endişeli, veya karışık hissetme, konsantrasyonda zorluk, titreme. Doktorunuz düşük kan şekerinizi nasıl kontrol altına alacağınızı ve bu belirtileri fark ettiğinizde yapmanız gerekenleri size bildirecektir. Eğer VİCTOZA® kullanırken, aynı zamanda sülfonilüre veya bazal insülin de kullanıyorsanız hipoglisemi oluşma riski daha yüksektir. VİCTOZA® kullanmaya başlamadan önce doktorunuz bu ilaçlarınızın dozunu düşürebilir.

Seyrek:

- Nefes alma güçlüğü, boğazda ve yüzde şişme, hızlı kalp atışı gibi ilave belirtilerin eşlik ettiği ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyon). Bunlardan herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
- Bağırsak tıkanması. Karın ağrısı, şişkinlik, kusma gibi ilave belirtilerin eşlik ettiği ağır kabızlık durumu.

Çok Seyrek:

- Pankreasın iltihaplanması durumları (pankreatit). Pankreatit, potansiyel olarak yaşamı tehdit edici ciddi bir sağlık durumu olabilir. Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz VİCTOZA® kullanmayı kesiniz ve hemen doktorunuza bildiriniz: Karından (mide bölgesi) başlayarak sırtınıza kadar ulaşabilecek şiddetli ve sürekli ağrı ile birlikte mide bulantısı ve kusma belirtileri pankreasın iltihaplanmış (pankreatit) olabileceğinin bir göstergesi olabilir.

Diğer yan etkiler

Çok yaygın:

- Bulantı (kendini hasta hissetme). Bu yan etki, genellikle ilacı kullandıkça zamanla geçer.
- Diyare (ishal). Bu yan etki, genellikle ilacı kullandıkça zamanla geçer.

Yaygın:

- Kusma.

VİCTOZA® ile tedaviye başlandığında, bazı durumlarda örneğin kusma, bulantı ve diyare (ishal) halinde sıvı kaybı/dehidratasyon yaşayabilirsiniz. Bol sıvı alarak dehidratasyonu önlemek önemlidir.

- Baş ağrısı
- Hazımsızlık
- Mide mukozası iltihabı (gastrit). Belirtileri mide ağrısı, bulantı ve kusma.
- Gastro-özofagal reflü hastalığı. Belirtisi göğüste yanma hissi.
- Karın ağrısı veya şişkinliği
- Karında rahatsızlık
- Kabızlık
- Gaz
- İştah azalması
- Bronşit (bronş iltihabı)
- Genel soğuk algınlığı
- Baş dönmesi
- Nabızda artış
- Yorgunluk
- Diş ağrısı
- Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (morarma, ağrı, tahriş, kaşıntı, döküntü gibi).

Yaygın olmayan:

- Kaşıntı ve ürtiker (bir tür deri döküntüsü) gibi alerjik reaksiyonlar
- Bazen böbrek fonksiyonlarında azalma ile dehidratasyon (su kaybı)
- Kırgınlık, halsizlik (kendini kötü hissetme).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. VİCTOZA®’nın saklanması

VİCTOZA®’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Karton veya kalem etiketi üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VİCTOZA®’yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.

Açmadan önce:

Buzdolabında (2°C-8°C) saklayınız. Dondurmayınız. Dondurucu bölümden uzakta saklayınız.

Kullanım sırasında:

Kaleminizi 1 ay süreyle, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ya da dondurucu bölümden uzakta olacak şekilde buzdolabında (2°C-8°C) saklayabilirsiniz. Dondurmayınız.

Işıktan korumak için, kullanmadığınız zamanlarda VİCTOZA® kalemin kapağını kapalı tutunuz.

Çözelti berrak ve renksiz, veya renksiz yakın görünümde değilse bu ilacı kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız VİCTOZA®’yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:7
34335 Etiler - İstanbul Türkiye

Üretim Yeri:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd, Danimarka

VİCTOZA®, NovoFine® ve NovoTwist® Novo Nordisk A/S, Danimarka’nın sahip olduğu ticari markalardır.

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

VİCTOZA® Kalem'in Kullanımı Kaleminizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. VİCTOZA® kaleminiz 18 mg liraglutid içermektedir. 0.6 mg, 1.2 mg ve 1.8 mg dozları seçebilirsiniz. VİCTOZA® kalem, 8 mm uzunluğa ve en ince 32 G'ye kadar (0.25/0.23 mm) NovoFine® veya NovoTwist® tek kullanımlık enjeksiyon iğne uçları ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.	İğne ucu (örnek) 
Victoza® Kalem 	
Kaleminizin kullanıma hazırlanması Kaleminizin VİCTOZA® olduğundan emin olmak için üzerindeki ismi ve renkli etiketi kontrol ediniz. Yanlış ilaç kullanımı ciddi zararlara sebep olabilir. Kalemin kapağını çekerek çıkartınız.	A 
Tek kullanımlık yeni bir iğnenin kağıt bandını çıkarınız. İğneyi kaleme düz ve sıkı bir şekilde çevirerek monte ediniz.	B 
Dış iğne kapağını çekerek çıkartınız ve daha sonrası için saklayınız.	C 
İç iğne kapağını çekerek çıkartınız ve atınız.	D 
⚠ Kontaminasyonu (dış ortamdan mikrop bulaşmasını), enfeksiyon oluşmasını, VİCTOZA®'nın sızmasını, iğne tıkanmasını ve yanlış dozlamayı önlemek için her enjeksiyon için her zaman yeni bir iğne ucu kullanınız.	

⚠ İğneyi bükmemek veya zarar vermemek için dikkatli olunuz. ⚠ İç iğne kapağını çıkardıktan sonra asla yerine takmaya çalışmayınız. Aksi halde iğneyi kendinize batırabilirsiniz.	
Kaleminizin bakımı • Kaleminizi onarmaya veya bir parçasını çıkarmaya çalışmayınız. • Kaleminizi toz, kir ve tüm sıvılardan uzak tutunuz. • Kaleminizi hafif bir deterjan ile nemlendirilmiş bez ile temizleyiniz. • Yıkamaya, suya batırmaya veya yağlamaya çalışmayınız – bu, kaleme zarar verebilir.	
⚠ Önemli bilgi • Kaleminizi bir başkasıyla paylaşmayınız. • Kaleminizi başkalarının, özellikle çocukların ulaşamayacakları şekilde muhafaza ediniz.	
Her yeni kalem ile akışı kontrol ediniz Her yeni kalem ile ilk enjeksiyon öncesinde akışı kontrol ediniz. Eğer kaleminiz hâlihazırda kullanılıyorsa, adım H, “Dozunuzun seçimi”ne gidiniz. Akış kontrolü sembolü belirteç ile aynı çizgiye gelene dek doz seçiciyi çeviriniz.	
Kalemi iğne ucu yukarı bakacak şekilde tutunuz. Kartuşa parmaklarınızla hafifçe birkaç kez vurunuz. Bu, kartuş içinde olabilecek havanın kartuşun tepesine toplanmasını sağlayacaktır.	
İğne ucunu yukarı doğru tutarak dozlama düğmesine 0 mg ile belirteç aynı çizgiye gelene dek basınız. İğne ucunda bir damla VİCTOZA® görülmelidir. Eğer damla görülmezse, E ile G adımları arasındaki işlemleri dört kez tekrarlayınız. Eğer hala damla görülmezse, iğne ucunu değiştirerek E ile G adımları arasındaki işlemleri bir kez daha tekrarlayınız. Halen hiç VİCTOZA® damlası görülüyorsa kalemi kullanmayınız. Bu, kaleme bir problem olduğunu gösterir ve yeni bir kalem kullanmanız gerekmektedir.	
⚠ Eğer kaleminizi sert bir yüzeye düşürürseniz veya kaleme ilgili bir sorundan şüphelenirseniz, her zaman yeni bir iğne ucu takınız ve enjeksiyon öncesi akışı kontrol	

ediniz.

Dozunuzun seçimi

Belirtecin her zaman 0 mg ile aynı çizgide olduğunu kontrol ediniz.

Doz seçiciyi ihtiyacınız olan doz belirteç ile aynı çizgiye gelene dek çeviriniz (0.6 mg, 1.2 mg veya 1.8 mg).

Yanlışlıkla yanlış bir doz seçerseniz, doğru doz belirteç ile aynı çizgiye gelene dek doz seçiciyi basitçe ileri veya geri çeviriniz.

Doz seçiciyi geriye doğru çevirirken dozlama düğmesine basmamaya dikkat ediniz, aksi takdirde VİCTOZA® dışarı çıkabilir.

Eğer doz seçici, ihtiyacınız olan doz, belirteç ile aynı çizgiye gelmeden önce duruyorsa, tam bir doz için yeterli VİCTOZA® kalmamıştır. Bu durumda:


Dozunuzu iki enjeksiyona ayırınız:

Doz seçiciyi belirteç, 0.6 mg veya 1.2 mg ile aynı çizgiye gelinceye dek çeviriniz. Dozu enjekte ediniz. Daha sonra yeni bir kalemi enjeksiyon için hazırlayınız ve dozunuzu tamamlamak için kalan miktarı enjekte ediniz.

Sadece eğitimini aldıysanız ya da doktorunuz o şekilde önerdiyse, dozunuzu mevcut kalem ve yeni bir kalem arasında bölebilirsiniz. Dozlarınızı hesaplamak için hesap makinesi kullanınız. Eğer dozunuzu yanlış bölerseniz, çok fazla ya da çok az VİCTOZA® enjekte edebilirsiniz.

Tam dozu yeni kalemle enjekte ediniz:

Eğer doz seçiciniz belirteç 0.6 mg ile aynı çizgiye gelmeden önce durursa, yeni bir kalem hazırlayınız ve tam dozu yeni kalemle enjekte ediniz.



- ⚠ 0.6 mg, 1.2 mg veya 1.8 mg dışında farklı bir doz seçmeye çalışmayınız. Doğru dozu aldığınızdan emin olmanız için, gösterge üzerindeki rakamlar belirteç ile tam olarak aynı çizgide olmalıdır.
- ⚠ Doz seçiciyi çevirdiğinizde klik sesi duyulur. Enjekte edeceğiniz VİCTOZA® dozunuzu seçmek için bu klikleri kullanmayınız.
- ⚠ Ne kadar VİCTOZA® enjekte edeceğinizi ölçmek için kartuş göstergesini kullanmayınız – yeterince doğru değildir.

Enjeksiyonun yapılışı İğneyi cilde doktorunuz ya da hemşirenizin gösterdiği enjeksiyon tekniğini kullanarak batırınız. Takiben aşağıdaki talimatları izleyiniz: Enjeksiyon için dozlama düğmesine 0 mg belirteç ile aynı çizgiye gelene dek basınız. Enjeksiyon sırasında diğer parmaklarınızla göstergeye dokunmamaya veya doz seçicinin yan taraflarına basmamaya özen gösteriniz. Çünkü bu, enjeksiyonu durdurabilir. Dozlama düğmesini basılı tutunuz ve iğneyi deri altında en az 6 saniye tutunuz. Bu, tam dozu aldığınızdan emin olmanızı sağlayacaktır.	
İğneyi çıkarınız. İğneyi çıkardıktan sonra, iğnenin ucunda bir damla VICTOZA® görebilirsiniz. Bu normaldir ve aldığınız doza etkisi yoktur.	
İğne ucunu, iğne ucuna ya da dış iğne kapağına dokunmadan dış iğne kapağının içine doğru yönlendiriniz.	
İğne tamamen içeri girdiğinde, dış iğne kapağını tamamen kapatacak şekilde dikkatlice itiniz. Sonra iğneyi çevirerek çıkarınız. İğneyi dikkatlice atınız ve kalemin kapağını yerine takınız. Kalem boşaldığında, iğne ucu takılı olmadan dikkatlice atınız. Kalemi ve iğneyi lütfen “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gerekliliklerine uygun olarak atınız.	
⚠ Her zaman enjeksiyon sonrasında iğne ucunu çıkarınız ve kaleminizi ucunda iğne ucu takılı olmaksızın saklayınız. ⚠ Bu, kontaminasyon (dış ortamdan mikrop bulaşması), enfeksiyon, VICTOZA® sızması, iğne tıkanması ve yanlış dozlama riskini azaltacaktır. ⚠ Hastalara bakmakla yükümlü olan kişiler, kullanılmış iğneleri atarken iğne yaralanmaları ve çapraz enfeksiyonu önlemek için çok dikkatli olmak zorundadırlar.	